

| レジメン名          | 薬剤名      | 剤形  | 投与量               | 単位                   | 投与時間      | 投与日        | 1コース |
|----------------|----------|-----|-------------------|----------------------|-----------|------------|------|
| CAPIRI+BEV療法   | ベバシズマブ   | 注射  | 7.5               | mg/kg                | 初回 90分    | Day 1      | 21日  |
|                |          |     |                   |                      | 2回目 60分   |            |      |
|                |          |     |                   |                      | 3回目以降 30分 |            |      |
| CAPIRI+BEV療法   | イリノテカン   | 注射  | 200               | mg/m <sup>2</sup>    | 90分       | Day 1      | 21日  |
|                | カペシタビン   | 内服  | 800               | mg/m <sup>2</sup> /回 | 1日2回      | 2週間服用1週間休薬 |      |
| CAPOX+BEV療法    | ベバシズマブ   | 注射  | 7.5               | mg/kg                | 初回 90分    | Day 1      | 21日  |
|                |          |     |                   |                      | 2回目 60分   |            |      |
|                |          |     |                   |                      | 3回目以降 30分 |            |      |
| CAPOX+BEV療法    | オキサリプラチン | 注射  | 130               | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1      | 21日  |
|                | カペシタビン   | 内服  | 1000              | mg/m <sup>2</sup> /回 | 1日2回      | 2週間服用1週間休薬 |      |
| CAPOX療法        | オキサリプラチン | 注射  | 130               | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1      | 21日  |
| CAPOX療法        | カペシタビン   | 内服  | 1000              | mg/m <sup>2</sup> /回 | 1日2回      | 2週間服用1週間休薬 |      |
|                |          |     |                   |                      |           |            |      |
| FOLFIRI+BEV療法  | ベバシズマブ   | 注射  | 5                 | mg/kg                | 初回 90分    | Day 1      | 14日  |
|                |          |     |                   |                      | 2回目 60分   |            |      |
|                |          |     |                   |                      | 3回目以降 30分 |            |      |
|                | イリノテカン   | 注射  | 150               | mg/m <sup>2</sup>    | 90分       | Day 1      |      |
|                | レボホリナート  | 注射  | 200               | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1      |      |
| フルオロウラシル       | 注射       | 400 | mg/m <sup>2</sup> | 15分                  | Day 1     |            |      |
| FOLFIRI+BEV療法  | フルオロウラシル | 注射  | 2400              | mg/m <sup>2</sup>    | 46時間      | Day 1      |      |
| FOLFIRI+PANI療法 | パニツムマブ   | 注射  | 6                 | mg/kg                | 60分       | Day 1      | 14日  |
|                | イリノテカン   | 注射  | 150               | mg/m <sup>2</sup>    | 90分       | Day 1      |      |
|                | レボホリナート  | 注射  | 200               | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1      |      |
|                | フルオロウラシル | 注射  | 400               | mg/m <sup>2</sup>    | 15分       | Day 1      |      |
|                | フルオロウラシル | 注射  | 2400              | mg/m <sup>2</sup>    | 46時間      | Day 1      |      |
| FOLFIRI+RAM療法  | ラムシルマブ   | 注射  | 8                 | mg/kg                | 初回 60分    | Day 1      | 14日  |
|                |          |     |                   |                      | 2回目以降 30分 |            |      |
|                | イリノテカン   | 注射  | 150               | mg/m <sup>2</sup>    | 90分       | Day 1      |      |
|                | レボホリナート  | 注射  | 200               | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1      |      |
|                | フルオロウラシル | 注射  | 400               | mg/m <sup>2</sup>    | 15分       | Day 1      |      |
| FOLFIRI+RAM療法  | フルオロウラシル | 注射  | 2400              | mg/m <sup>2</sup>    | 46時間      | Day 1      |      |
| FOLFIRI療法      | イリノテカン   | 注射  | 150               | mg/m <sup>2</sup>    | 90分       | Day 1      | 14日  |
|                | レボホリナート  | 注射  | 200               | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1      |      |
|                | フルオロウラシル | 注射  | 400               | mg/m <sup>2</sup>    | 15分       | Day 1      |      |
|                | フルオロウラシル | 注射  | 2400              | mg/m <sup>2</sup>    | 46時間      | Day 1      |      |
| FOLFOX+BEV療法   | ベバシズマブ   | 注射  | 5                 | mg/kg                | 初回 90分    | Day 1      | 14日  |
|                |          |     |                   |                      | 2回目 60分   |            |      |
|                |          |     |                   |                      | 3回目以降 30分 |            |      |
|                | オキサリプラチン | 注射  | 85                | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1      |      |
|                | レボホリナート  | 注射  | 200               | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1      |      |
| FOLFOX+BEV療法   | フルオロウラシル | 注射  | 400               | mg/m <sup>2</sup>    | 15分       | Day 1      |      |
| FOLFOX+BEV療法   | フルオロウラシル | 注射  | 2400              | mg/m <sup>2</sup>    | 46時間      | Day 1      |      |
| FOLFOX+PANI療法  | パニツムマブ   | 注射  | 6                 | mg/kg                | 60分       | Day 1      | 14日  |
|                | オキサリプラチン | 注射  | 85                | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1      |      |
|                | レボホリナート  | 注射  | 200               | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1      |      |
|                | フルオロウラシル | 注射  | 400               | mg/m <sup>2</sup>    | 15分       | Day 1      |      |
|                | フルオロウラシル | 注射  | 2400              | mg/m <sup>2</sup>    | 46時間      | Day 1      |      |

|                 |          |    |       |                      |                                |               |     |
|-----------------|----------|----|-------|----------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| FOLFOXIRI+BEV療法 | ベバシズマブ   | 注射 | 5     | mg/kg                | 初回 90分<br>2回目 60分<br>3回目以降 30分 | Day 1         | 14日 |
|                 | イリノテカン   | 注射 | 150   | mg/m <sup>2</sup>    | 90分                            | Day 1         |     |
|                 | オキサリプラチン | 注射 | 85    | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間                            | Day 1         |     |
|                 | レボホリナート  | 注射 | 200   | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間                            | Day 1         |     |
|                 | フルオロウラシル | 注射 | 2400  | mg/m <sup>2</sup>    | 46時間                           | Day 1         |     |
| FOLFOX療法        | オキサリプラチン | 注射 | 85    | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間                            | Day 1         | 14日 |
|                 | レボホリナート  | 注射 | 200   | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間                            | Day 1         |     |
|                 | フルオロウラシル | 注射 | 400   | mg/m <sup>2</sup>    | 15分                            | Day 1         |     |
|                 | フルオロウラシル | 注射 | 2400  | mg/m <sup>2</sup>    | 46時間                           | Day 1         |     |
| FTD/TPI+BEV療法   | ベバシズマブ   | 注射 | 5     | mg/kg                | 初回 90分<br>2回目 60分<br>3回目以降 30分 | Day 1, 15     | 28日 |
|                 | TAS-102  | 内服 | 35    | mg/m <sup>2</sup> /回 | 1日2回                           | Day 1-5, 8-12 |     |
| IRI+PANI療法      | パニツムマブ   | 注射 | 6     | mg/kg                | 60分                            | Day 1         | 14日 |
|                 | イリノテカン   | 注射 | 150   | mg/m <sup>2</sup>    | 90分                            | Day 1         |     |
| IRIS+BEV療法      | ベバシズマブ   | 注射 | 5     | mg/kg                | 初回 90分<br>2回目 60分<br>3回目以降 30分 | Day 1, 15     | 28日 |
|                 | イリノテカン   | 注射 | 100   | mg/m <sup>2</sup>    | 90分                            | Day 1, 15     |     |
|                 | S-1      | 内服 | 40-60 | mg/回                 | 1日2回                           | 2週間服用2週間休薬    |     |
| IRIS療法          | イリノテカン   | 注射 | 125   | mg/m <sup>2</sup>    | 90分                            | Day 1, 15     | 28日 |
|                 | S-1      | 内服 | 40-60 | mg/回                 | 1日2回                           | 2週間服用2週間休薬    |     |
| PANI療法          | パニツムマブ   | 注射 | 6     | mg/kg                | 60分                            | Day 1         | 14日 |
| SOX+BEV療法       | ベバシズマブ   | 注射 | 7.5   | mg/kg                | 初回 90分<br>2回目 60分<br>3回目以降 30分 | Day 1         | 21日 |
|                 | オキサリプラチン | 注射 | 130   | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間                            | Day 1         |     |
|                 | S-1      | 内服 | 40-60 | mg/回                 | 1日2回                           | 2週間服用1週間休薬    |     |
| ニボルマブ単独         | ニボルマブ    | 注射 | 240   | mg                   | 30分                            | Day 1         | 14日 |
| ペムブロリズマブ単独      | ペムブロリズマブ | 注射 | 200   | mg                   | 30分                            | Day 1         | 21日 |

## 【胃がん】

2024年9月1日 現在

| レジメン名           | 薬剤名      | 剤形 | 投与量   | 単位                   | 投与時間      | 投与日          | 1コース |
|-----------------|----------|----|-------|----------------------|-----------|--------------|------|
| CAPOX+Tmab療法    | トラスツズマブ  | 注射 | 8     | mg/kg                | 初回 90分    | 初回 Day 1     | 21日  |
|                 |          |    | 6     | mg/kg                | 2回目以降 30分 | 2回目以降 Day 1  |      |
|                 | オキサリプラチン | 注射 | 130   | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1        |      |
|                 | カペシタビン   | 内服 | 1000  | mg/m <sup>2</sup> /回 | 1日2回      | 2週間服用1週間休薬   |      |
| CAPOX+ニボルマブ療法   | ニボルマブ    | 注射 | 360   | mg                   | 30分       | Day 1        | 21日  |
|                 | オキサリプラチン | 注射 | 130   | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1        |      |
|                 | カペシタビン   | 内服 | 1000  | mg/m <sup>2</sup> /回 | 1日2回      | 2週間服用1週間休薬   |      |
| CAPOX療法         | オキサリプラチン | 注射 | 130   | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1        | 21日  |
|                 | カペシタビン   | 内服 | 1000  | mg/m <sup>2</sup> /回 | 1日2回      | 2週間服用1週間休薬   |      |
| FOLFOX+ニボルマブ療法  | ニボルマブ    | 注射 | 240   | mg                   | 30分       | Day 1        | 14日  |
|                 | オキサリプラチン | 注射 | 85    | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1        |      |
|                 | レボホリナート  | 注射 | 200   | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1        |      |
|                 | フルオロウラシル | 注射 | 400   | mg/m <sup>2</sup>    | 15分       | Day 1        |      |
|                 | フルオロウラシル | 注射 | 2400  | mg/m <sup>2</sup>    | 46時間      | Day 1        |      |
| IRI療法           | イリノテカン   | 注射 | 150   | mg/m <sup>2</sup>    | 90分       | Day 1        | 14日  |
| RAM療法           | ラムシルマブ   | 注射 | 8     | mg/kg                | 初回 60分    | Day 1        | 14日  |
|                 |          |    | 8     | mg/kg                | 2回目以降 30分 |              |      |
| S-1+DTX療法       | ドセタキセル   | 注射 | 40    | mg/m <sup>2</sup>    | 60分       | Day 1        | 21日  |
|                 | S-1      | 内服 | 40-60 | mg/回                 | 1日2回      | 2週間服用1週間休薬   |      |
| SOX+Tmab療法      | トラスツズマブ  | 注射 | 8     | mg/kg                | 初回 90分    | 初回 Day 1     | 21日  |
|                 |          |    | 6     | mg/kg                | 2回目以降 30分 | 2回目以降 Day 1  |      |
|                 | オキサリプラチン | 注射 | 100   | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1        |      |
|                 | S-1      | 内服 | 40-60 | mg/回                 | 1日2回      | 2週間服用1週間休薬   |      |
| SOX+ニボルマブ療法     | ニボルマブ    | 注射 | 360   | mg                   | 30分       | Day 1        | 21日  |
|                 | オキサリプラチン | 注射 | 100   | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1        |      |
|                 | S-1      | 内服 | 40-60 | mg/回                 | 1日2回      | 2週間服用1週間休薬   |      |
| SOX療法           | オキサリプラチン | 注射 | 100   | mg/m <sup>2</sup>    | 2時間       | Day 1        | 21日  |
|                 | S-1      | 内服 | 40-60 | mg/回                 | 1日2回      | 2週間服用1週間休薬   |      |
| weeklyPTX+RAM療法 | ラムシルマブ   | 注射 | 8     | mg/kg                | 初回 60分    | Day 1, 15    | 28日  |
|                 |          |    |       |                      | 2回目以降 30分 |              |      |
| weeklyPTX療法     | パクリタキセル  | 注射 | 80    | mg/m <sup>2</sup>    | 60分       | Day 1, 8, 15 | 28日  |
|                 |          |    |       |                      | 60分       |              |      |
| ニボルマブ単独         | ニボルマブ    | 注射 | 240   | mg                   | 30分       | Day 1        | 14日  |

## 【乳がん】

2024年9月1日 現在

| レジメン名           | 薬剤名            | 剤形 | 投与量               | 単位                | 投与時間                | 投与日            | 1コース |
|-----------------|----------------|----|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|------|
| AC療法            | ドキソルビシン        | 注射 | 60                | mg/m <sup>2</sup> | 30分                 | Day 1          | 21日  |
|                 | エンドキサン         | 注射 | 600               | mg/m <sup>2</sup> | 30分                 | Day 1          |      |
| DTX療法           | ドセタキセル         | 注射 | 75                | mg/m <sup>2</sup> | 60分                 | Day 1          | 21日  |
| dose-dense EC療法 | エピルビシン         | 注射 | 90                | mg/m <sup>2</sup> | 15分                 | Day 1          | 14日  |
|                 | エンドキサン         | 注射 | 600               | mg/m <sup>2</sup> | 30分                 | Day 1          |      |
|                 | ペグフィルグラスチム     | 注射 | 3.6               | mg                | 皮下注                 | Day 2 or Day 3 |      |
| EC療法            | エピルビシン         | 注射 | 90                | mg/m <sup>2</sup> | 15分                 | Day 1          | 21日  |
|                 | エンドキサン         | 注射 | 600               | mg/m <sup>2</sup> | 30分                 | Day 1          |      |
| フェスゴ+DTX療法      | フェスゴIN, MA     | 注射 | IN 1              | V                 | 皮下注 8分              | 初回 Day 1       | 21日  |
|                 |                | 注射 | MA 1              | V                 | 皮下注 5分              | 2回目以降 Day 1    |      |
|                 | ドセタキセル         | 注射 | 75                | mg/m <sup>2</sup> | 60分                 | Day 1          |      |
| フェスゴ療法（維持）      | フェスゴMA         | 注射 | MA 1              | V                 | 皮下注 5分              | Day 1          | 21日  |
| PER+Tmab+DTX療法  | ペルツズマブ         | 注射 | 840               | mg                | 初回 60分              | 初回 Day 1       | 21日  |
|                 |                | 注射 | 420               | mg                | 2回目以降 30分           | 2回目以降 Day 1    |      |
|                 | トラスツズマブ        | 注射 | 8                 | mg/kg             | 初回 90分              | 初回 Day 1       |      |
|                 |                | 注射 | 6                 | mg/kg             | 2回目以降 30分           | 2回目以降 Day 1    |      |
| ドセタキセル          | 注射             | 75 | mg/m <sup>2</sup> | 60分               | Day 1               |                |      |
| PER+Tmab+PTX療法  | ペルツズマブ         | 注射 | 840               | mg                | 初回 60分              | 初回 Day 1       | 21日  |
|                 |                | 注射 | 420               | mg                | 2回目以降 30分           | 2回目以降 Day 1    |      |
|                 | トラスツズマブ        | 注射 | 8                 | mg/kg             | 初回 90分              | 初回 Day 1       |      |
|                 |                | 注射 | 6                 | mg/kg             | 2回目以降 30分           | 2回目以降 Day 1    |      |
| パクリタキセル         | 注射             | 80 | mg/m <sup>2</sup> | 60分               | Day 1, 8, 15        |                |      |
| PER+Tmab療法      | ペルツズマブ         | 注射 | 840               | mg                | 初回 60分              | 初回 Day 1       | 21日  |
|                 |                | 注射 | 420               | mg                | 2回目以降 30分           | 2回目以降 Day 1    |      |
|                 | トラスツズマブ        | 注射 | 8                 | mg/kg             | 初回 90分              | 初回 Day 1       |      |
|                 |                | 注射 | 6                 | mg/kg             | 2回目以降 30分           | 2回目以降 Day 1    |      |
| PTX+Bev療法       | パクリタキセル        | 注射 | 90                | mg/m <sup>2</sup> | 60分                 | Day 1, 8, 15   | 28日  |
|                 | ベバシズマブ         | 注射 | 10                | mg/kg             | 初回 90分              | Day 1, 15      |      |
|                 |                | 注射 |                   |                   | 2回目 60分             |                |      |
| PTX療法・1週毎       | パクリタキセル        | 注射 | 80                | mg/m <sup>2</sup> | 60分                 | Day 1          | 7日   |
| TC療法            | ドセタキセル         | 注射 | 75                | mg/m <sup>2</sup> | 60分                 | Day 1          | 21日  |
|                 | エンドキサン         | 注射 | 600               | mg/m <sup>2</sup> | 30分                 | Day 1          |      |
| T-DM1療法         | トラスツズマブ エムタンシン | 注射 | 3.6               | mg/kg             | 初回 90分<br>2回目以降 30分 | Day 1          | 21日  |
| Tmab+DTX療法      | トラスツズマブ        | 注射 | 8                 | mg/kg             | 初回 90分              | 初回 Day 1       | 21日  |
|                 |                | 注射 | 6                 | mg/kg             | 2回目以降 30分           | 2回目以降 Day 1    |      |
|                 | ドセタキセル         | 注射 | 75                | mg/m <sup>2</sup> | 60分                 | Day 1          |      |
| Tmab+PTX療法・1週毎  | トラスツズマブ        | 注射 | 4                 | mg/kg             | 初回 90分              | 初回 Day 1       | 7日   |
|                 |                | 注射 | 2                 | mg/kg             | 2回目以降 30分           | 2回目以降 Day 1    |      |
|                 | パクリタキセル        | 注射 | 80                | mg/m <sup>2</sup> | 60分                 | Day 1          |      |
| Tmab療法・1週毎      | トラスツズマブ        | 注射 | 4                 | mg/kg             | 初回 90分              | 初回 Day 1       | 7日   |
|                 |                | 注射 | 2                 | mg/kg             | 2回目以降 30分           | 2回目以降 Day 1    |      |
| Tmab療法・3週毎      | トラスツズマブ        | 注射 | 8                 | mg/kg             | 初回 90分              | 初回 Day 1       | 21日  |
|                 |                | 注射 | 6                 | mg/kg             | 2回目以降 30分           | 2回目以降 Day 1    |      |
| エリブリン療法         | エリブリン          | 注射 | 1.4               | mg/m <sup>2</sup> | 5分                  | Day 1, 8       | 21日  |

## 【食道がん】

2024年3月1日 現在

| レジメン名          | 薬剤名      | 剤形 | 投与量 | 単位                | 投与時間 | 投与日               | 1コース |
|----------------|----------|----|-----|-------------------|------|-------------------|------|
| FP療法（術前）       | シスプラチン   | 注射 | 80  | mg/m <sup>2</sup> | 2時間  | Day 1             | 21日  |
|                | フルオロウラシル | 注射 | 800 | mg/m <sup>2</sup> | 24時間 | Day 1, 2, 3, 4, 5 |      |
| ニボルマブ+イピリムマブ療法 | ニボルマブ    | 注射 | 360 | mg                | 30分  | Day 1, 22         | 42日  |
|                | イピリムマブ   | 注射 | 1   | mg/kg             | 30分  | Day 1             |      |
| ニボルマブ単独        | ニボルマブ    | 注射 | 240 | mg                | 30分  | Day 1             | 14日  |

## 【膵がん】

2024年3月1日 現在

| レジメン名         | 薬剤名        | 規格 | 投与量  | 単位                | 投与時間 | 投与日          | 1コース |
|---------------|------------|----|------|-------------------|------|--------------|------|
| GEM療法         | ゲムシタピン     | 注射 | 1000 | mg/m <sup>2</sup> | 30分  | Day 1, 8, 15 | 28日  |
| nab-PTX+GEM療法 | nabパクリタキセル | 注射 | 125  | mg/m <sup>2</sup> | 30分  | Day 1, 8, 15 | 28日  |
|               | ゲムシタピン     | 注射 | 1000 | mg/m <sup>2</sup> | 30分  | Day 1, 8, 15 |      |

## 【卵巣がん】

2024年3月1日 現在

| レジメン名           | 薬剤名     | 剤形 | 投与量 | 単位                | 投与時間    | 投与日          | 1コース |
|-----------------|---------|----|-----|-------------------|---------|--------------|------|
| dose-dense TC療法 | パクリタキセル | 注射 | 80  | mg/m <sup>2</sup> | 60分     | Day 1, 8, 15 | 21日  |
|                 | カルボプラチン | 注射 | 6   | (AUC)             | 60分     | Day 1        |      |
| TC+BEV療法        | パクリタキセル | 注射 | 175 | mg/m <sup>2</sup> | 3時間     | Day 1        | 21日  |
|                 | カルボプラチン | 注射 | 6   | (AUC)             | 60分     | Day 1        |      |
|                 | ベバシズマブ  | 注射 | 15  | mg/kg             | 初回 90分  | Day 1        |      |
|                 |         |    |     |                   | 2回目 60分 |              |      |
| 3回目以降 30分       |         |    |     |                   |         |              |      |